Потеря обоняния

Насморк

Диарея

Одышка

Боль в горле

Головная боль

Искажение вкуса

Заложенность ушей

Боль в суставах (ломота)





часто

часто

иногда

иногда

иногда

часто

иногда

часто

редко

иногда

иногда

часто

часто

иногда

нет

нет

нет

редко

иногда

часто

редко

редко

редко

часто

иногда

редко

нет



О ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ ГРИППА В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ

ЧТО ВХОДИТ В СОСТАВ ВАКЦИНЫ ПРОТИВ ГРИППА?

Первые три штамма рекомендуются для включения в трехвівлетные противотриппозные важины, а последний вяляется рекомекцуямма, дологнетельным штаммом для четыреквілентных противогриппозных вакции. ЗАЧЕМ ДЕЛЯТЬ ПРИВИВКУ КАЖДЫЙ ГОД?

МОЖНО ПИ ЗАБОЛЕТЬ ГРИППОМ ОТ ВАКЦИНЫ

ЕСЛИ Я СДЕЛАЮ ПРИВИВКУ ПРОТИВ ГРИППА, ЗАБОЛЕЮ ЛИ Я ГРИППОМ?









РОСПОТРЕБНАДЗОР

ЕДИНЫЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
РОСПОТРЕБНАДЗОРА 8-803-555-49-43

ОСТОРОЖНО: ГРИПП!





















ПРОФИЛАКТИКА ГРИППА













ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ЗАБОЛЕЛИ













РОСПОТРЕБНАДЗОР единый консультационный центр роспотребнадзора 8-800-555-49-43

ГРИПП – ОПАСНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ В ГРУППЕ ОСТРЫХ РЕСПИРАТОРНЫХ ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ













О РАЗЛИЧИЯХ СИМПТОМОВ ГРИППА И ОРВИ





У ДЕТЕЙ ДО 5 ЛЕТ У ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ХРОНИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

СИМПТОМЫ ПРОСТУДЫ (ОРВИ)

Постепенное начало, лихорадка (до 38 °С), насморк с обильным слизистым отделяемым, заложенность носа, кашель, чихание, боль в горле. Обычно прогноз благогриятный, выздоровление как правило наступает черя 7-7 до дней, хота симптомы могут сохраняться до 2 недель. Специфической важщины от простуды не существует.

СИМПТОМЫ ГРИППА

Внезалние начало, сухой, отрывистый кашель, лисорадка до 40° С, озноб, боль в мышцах, спояныя боль, боль в горле, залюженность носа при откустении отделенности с носовых хоров, систыма угольсть, ктогора может длигься до двух недель, возможны тошнота, риота, диврея, При новелением первых смистимов заболевания – оставайтесь, дома и вызовите врача. Самолечение недолустимо.

Подробнее на www.rospotrebnadzor.ru

